



บันทึกข้อความ

งานสารบรรณ

รับที่ 3974
วันที่ 28 มิ.ย. 57

ส่วนราชการ กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

ที่ รพจ.11/55

วันที่ 17 เมษายน 2557

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานการบำบัดทางสังคม

เรียน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

ตามที่กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ได้ปฏิบัติงานการบำบัดทางสังคม 2 รูปแบบ คือ การบำบัดทางสังคมแบบกลุ่มด้วยทฤษฎี REBT ร่วมกับดนตรีบำบัด และการบำบัดแบบครอบครัว (คลินิกเด็กรัก) ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาพบว่า หลังจากผู้ป่วยจิตเวชจำนวน 60 ราย เข้ารับการบำบัดแบบกลุ่มด้วยทฤษฎี REBT ร่วมกับดนตรีบำบัด มีปฏิกิริยาทางใจลดลงเรื่อยๆ และ ผู้ป่วยจำนวน 55 ราย ที่เข้ารับการบำบัดแบบครอบครัว มีปฏิกิริยาทางใจลดลงเรื่อยๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นางนวลลักษณ์ เลหาพันธ์)

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ

(นาย ชัย ชัย)

28 เม.ย. 57

ตอบ, ดึงมา

แจ้ง คุณสุวิมล งาน-ผู้ประสานงานเพื่อขอผล.ใช้ประจำสภ.หนอง

28 มิ.ย. 2557

ได้ทราบต่อไป

รับ ณ. สภ.หนองบัว

ผู้ประสานงาน ที่หนองบัว

นายสุวิมล (นางสาว) ใจทวี ใจทวี 6 รพ.

เพื่อ ให้ประสานงาน

6 มิ.ย. 57

รายงานผลการบำบัดแบบกลุ่มในรอบ 6 เดือน

ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557

กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ได้ปฏิบัติงานการบำบัดทางสังคมในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งได้ดำเนินการบำบัดแบบกลุ่มด้วยทฤษฎี REBT ร่วมกับคนตรีบำบัดเพื่อลดปฏิกิริยาทางใจในผู้ป่วยจิตเวชที่ติดสารแอมเฟตามีน ดังมีรายละเอียดดังนี้

สูตรคิด

$$\text{ร้อยละของคะแนนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น} = \frac{\text{จำนวนผู้ป่วยที่มีคะแนนเพิ่มมากขึ้น}}{\text{จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด}} \times 100$$

ประเมินผลการบำบัดแบบกลุ่มด้วยทฤษฎี REBT ร่วมกับคนตรีบำบัด

ณ ตึกกิจกรรมกลุ่มบำบัด ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2556 - มีนาคม 2557 (N=60)

ตารางที่ 1 ประเมินปฏิกิริยาทางใจของผู้ป่วยจิตเวช หลังจากเข้ารับการบำบัดแบบกลุ่มด้วยทฤษฎี REBT ร่วมกับคนตรี ณ ตึกจิตสังคมบำบัด

ลำดับที่	ก่อนบำบัด	หลังบำบัด
1	7.00	4.00
2	8.00	5.00
3	3.00	1.00
4	8.00	1.00
5	8.00	4.00
6	10.00	1.00
7	10.00	1.00
8	9.00	4.00
9	9.00	5.00
10	7.00	4.00
11	5.00	1.00
12	5.00	1.00
13	10.00	4.00
14	7.00	5.00
15	5.00	4.00
16	7.00	5.00

ลำดับที่	ก่อนบำบัด	หลังบำบัด
17	6.00	4.00
18	4.00	2.00
19	10.00	2.00
20	3.00	2.00
21	7.00	5.00
22	10.00	1.00
23	6.00	3.00
24	10.00	1.00
25	10.00	1.00
26	9.00	4.00
27	10.00	2.00
28	6.00	5.00
29	10.00	5.00
30	5.00	4.00
31	10.00	5.00
32	8.00	5.00
33	10.00	1.00
34	10.00	4.00
35	10.00	5.00
36	7.00	4.00
37	7.00	2.00
38	9.00	7.00
39	7.00	1.00
40	6.00	1.00
41	5.00	2.00
42	5.00	1.00
43	10.00	1.00
44	6.00	2.00
45	10.00	9.00
46	10.00	8.00
47	5.00	2.00
48	10.00	7.00
49	8.00	7.00
50	10.00	7.00

ลำดับที่	ก่อนบำบัด	หลังบำบัด
51	3.00	1.00
52	3.00	1.00
53	3.00	1.00
54	4.00	1.00
55	8.00	7.00
56	10.00	3.00
57	6.00	4.00
58	5.00	3.00
59	7.00	4.00
60	5.00	2.00

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ป่วยจิตเวชที่ติดสารแอมเฟตามีน มาใช้บริการบำบัดแบบกลุ่มด้วยทฤษฎี REBT ร่วมกับดนตรี มีปฏิกิริยาทางใจลดลง ร้อยละ 100

รายงานผลการบำบัดทางสังคมในรอบ 6 เดือน

ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557

กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ได้ดำเนินการบำบัด คือ การบำบัดครอบครัว (คลินิกเด็กรัก) และ
ขอเสนอผลการบำบัด ในรอบ 6 เดือนปีงบประมาณ 2557 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ผลการบำบัดครอบครัว (คลินิกเด็กรัก) ทุกวันจันทร์ พุธที่อาคารแพทย์ทางเลือก เวลา 08.30-16.30 น.
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนมีนาคม 2557

1. เกณฑ์การให้คะแนนปฏิกิริยาทางใจ

การวัดจะมีคะแนนสำหรับวัดปฏิกิริยาทางใจตั้งแต่ 1-10 วัดก่อนการบำบัด และหลังการบำบัดทุกครั้ง
คะแนนมากแสดงว่ามีปฏิกิริยาทางใจมาก คะแนนน้อยลงแสดงว่ามีปฏิกิริยาทางใจน้อยลง

สูตรคิด

$$\text{ร้อยละของคะแนนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น} = \frac{\text{จำนวนผู้ป่วยที่มีคะแนนเพิ่มมากขึ้น}}{\text{จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด}} \times 100$$

2. เกณฑ์การให้ระดับคะแนนในหัวข้อมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา ดังนี้

มากที่สุด	กำหนดให้	5 คะแนน
มาก	กำหนดให้	4 คะแนน
ปานกลาง	กำหนดให้	3 คะแนน
น้อย	กำหนดให้	2 คะแนน
น้อยที่สุด	กำหนดให้	1 คะแนน

นำคะแนนที่ได้มาแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ

สูตรคิดรายชื่อ

$$\text{ร้อยละของจำนวนคนในแต่ละระดับการแก้ไขปัญหา} = \frac{\text{จำนวนคนทั้งหมด}}{\text{จำนวนคนที่ได้คะแนนในแต่ละระดับ}} \times 100$$

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและ ข้อมูลสภาพปัญหาผู้ป่วย N=55

ประเภทผู้ป่วยที่ให้บริการ	จำนวน
ข้อมูลทั่วไป	
คู่	18
โสด	16
หม้าย	4
หย่าร้าง	1
อายุ	
15 – 35 ปี	16
36 - 55 ปี	10
56 – 75 ปี	13
อาชีพ	
ค้าขาย/เจ้าของกิจการ	3
นักบวช	1
ทำนา	7
นักศึกษา	2
แม่บ้าน	-
รับจ้าง	2
รับราชการ	1
ว่างงาน	23
ประเภทผู้ป่วยที่มารับบริการ	
1. ผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าและเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย	33
2. ผู้ป่วยมีความวิตกกังวลสูง	1
3. ผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตจากสุรา/ยาเสพติด	2
4. ความเจ็บป่วยเรื้อรังทางกาย	1
5. ปัญหาการสื่อสาร	-
6. ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูก	-
7. ไม่สามารถจัดการกับความขัดแย้งในครอบครัว	-
8. ปัญหาความแตกแยกในครอบครัว	-
9. ปัญหาเศรษฐกิจในครอบครัว	-

ลำดับที่	ก่อนบำบัด	หลังบำบัด
24	9	4
25	10	4
26	8	4
27	9	4
28	10	5
29	10	5
30	8	5
31	10	6
32	10	6
33	10	5
34	10	5
35	10	6
36	10	6
37	10	5
38	8	4
39	10	6

จากตารางที่ 2 พบว่าผู้มารับบริการครอบครัวบำบัด (คลินิกเด็มรัก) มีปฏิกิริยาทางใจลดลง ร้อยละ 100

ตารางที่ 3 ระดับการแก้ไขปัญหของผู้รับบริการ

ระดับ	ความถี่	ร้อยละ
มากที่สุด	27	66.7
มาก	10	28.2
ปานกลาง	2	5.1
รวม	39	100

จากตารางที่ 3 พบว่าผู้รับบริการมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาร้อยละ 100

โดยพบว่ามีแนวทางแก้ไขปัญหาระดับมากที่สุดเป็นส่วนใหญ่ร้อยละ 66.7 รองลงมา มีแนวทางแก้ไขปัญหาระดับมาก ร้อยละ 28.2 และปานกลาง ร้อยละ 5.1 และผู้ป่วยมีแนวทางในการแก้ไขปัญห เช่น มีการสื่อสารในครอบครัวดีขึ้น สามารถอยู่ร่วมกันในครอบครัวได้มีความสุขมากขึ้น ญาติได้แนวทางในการดูแลผู้ป่วยที่บ้านมากขึ้น